

核准日期: 2026年02月02日  
修改日期: 2026年02月09日  
2026年02月10日

皇隆® 奇谷素®



# 维生素B<sub>6</sub>注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

## 【药品名称】

通用名称: 维生素B<sub>6</sub>注射液

英文名称: Vitamin B<sub>6</sub> Injection


汉语拼音: Weishengsu B<sub>6</sub> Zhusheyey

## 【成份】

本品活性成份为维生素B<sub>6</sub>。

化学名称: 6-甲基-5-羟基-3, 4-吡啶二甲醇  
盐酸盐

化学结构式:



分子式: C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>3</sub> · HCl

分子量: 205.64

辅料: 氢氧化钠、盐酸、注射用水。

【性状】本品为无色至淡黄色的澄明液体。

## 【适应症】

1、适用于维生素B<sub>6</sub>缺乏的预防和治疗。防治异烟肼中毒。也可用于妊娠、放射病及抗癌药所致的呕吐, 脂溢性皮炎等。

2、全胃肠道外营养及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素B<sub>6</sub>的补充。

3、下列情况对维生素B<sub>6</sub>需要量增加: 妊娠及哺乳期、甲状腺功能亢进、烧伤、长期慢性感染、发热、先天性代谢障碍病(胱硫醚尿症、高草酸盐症、高胱氨酸尿症、黄嘌呤酸尿症)、充血性心力衰竭、长期血液透析、吸收不良综合征伴肝胆系统疾病(如酒精中毒伴肝硬化)、肠道疾病(乳糜泻、热带口炎性肠炎、局限性肠炎、持续腹泻)、胃切除术后。

4、新生儿遗传性维生素B<sub>6</sub>依赖综合征。

【规格】1ml: 100mg

## 【用法用量】

肌内或静脉注射, 1次50mg~100mg, 1日1次。用于环丝氨酸中毒的解毒时, 每日300mg或300mg以上。用于异烟肼中毒解毒时, 每1g异烟肼给1g维生素B<sub>6</sub>静注。或遵医嘱。

## 【不良反应】

维生素B<sub>6</sub>在肾功能正常时几乎不产生毒性和罕见过敏反应。若每天应用200mg, 持续30天以上, 可致依赖综合征。

上市后药品不良反应监测发现本品有以下不良反应/事件报告:

全身性反应: 寒战、畏寒、发热、乏力等;  
皮肤及其附件: 皮疹、瘙痒、发红、多汗等;  
胃肠系统: 恶心、呕吐、腹痛、腹部不适等;  
神经系统: 头晕、头痛、感觉异常、烦躁等;

心血管系统: 胸闷、心悸、发绀、血压升高或下降等;

呼吸系统: 呼吸急促、呼吸困难等;  
用药部位: 注射部位疼痛、注射部位瘙痒、注射部位皮疹等;

肌肉骨骼: 肢体疼痛等;  
免疫系统: 过敏样反应、过敏性休克等;  
其他: 潮红、苍白、四肢发冷等。  
还有嗜睡和血清叶酸水平低的报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

## 【注意事项】

1、维生素B<sub>6</sub>对下列情况未能证实确实疗效, 如痤疮及其他皮肤病、酒精中毒、哮喘、肾结石、精神病、偏头痛、经前期紧张、刺激乳汁分泌、食欲不振。不宜应用大剂量维生素B<sub>6</sub>治疗未经证实有效的疾病。

2、维生素B<sub>6</sub>影响左旋多巴治疗帕金森病的疗效, 但对卡比多巴的疗效无影响。

3、对诊断的干扰: 尿胆原试验呈假阳性。  
4、使用本品期间, 如出现任何不良事件和/或

不良反应, 请咨询医生。

5、同时使用其它药品, 请告知医生。

6、请放置于儿童不能够触及的地方。

7、本品所含的铝可能存在毒性。对于肾功能受损的患者, 长期肠外营养支持可能导致铝蓄积并达到毒性水平。尤其是早产儿, 由于其肾脏发育不成熟, 并需要输注大量含有钙和磷酸盐的溶液, 而这些溶液中含铝。研究表明, 肾功能受损的患者, 包括早产儿, 经肠外途径摄入的铝高于4~5ug/kg/天时, 蓄积的铝与中枢神经系统和骨骼毒性相关。即使在更低给药速度时仍可能发生组织铝含量超载。

## 【孕妇及哺乳期妇女用药】

孕妇接受大量维生素B<sub>6</sub>, 可致新生儿维生素B<sub>6</sub>依赖综合征。乳母摄入正常需要量对婴儿无不良影响。

【儿童用药】请遵医嘱。

【老年用药】请遵医嘱。

## 【药物相互作用】

1、氯霉素、环丝氨酸、乙硫异烟胺、盐酸胍酞嗪、免疫抑制剂包括肾上腺皮质激素、环磷酰胺、环孢素、异烟肼、青霉胺等药物可拮抗维生素B<sub>6</sub>或增加维生素B<sub>6</sub>经肾排泄, 可引起贫血或周围神经炎。

2、服用雌激素时应增加维生素B<sub>6</sub>用量。

3、左旋多巴与小剂量维生素B<sub>6</sub>(每日5mg)合用, 即可拮抗左旋多巴的抗震颤作用。

## 【药物过量】

每日应用2~6g, 持续几个月, 可引起严重神经感觉异常、进行性步态不稳至足麻木、手不灵活, 停药后可缓解, 但仍软弱无力。

## 【临床药理】

### 药代动力学

维生素B<sub>6</sub>与血浆蛋白不结合, 磷酸吡哆醛与血浆蛋白结合。维生素B<sub>6</sub>的t<sub>1/2</sub>长达15~20天。肝内代谢, 经肾排泄。可经血液透析而排出。

## 【药理毒理】

本品为维生素类药。维生素B<sub>6</sub>在红细胞内转化为磷酸吡哆醛, 作为辅酶对蛋白质、碳水化合物、脂类的各种代谢功能起作用, 同时还参与色氨酸转化成烟酸或5-羟色胺。

## 【贮藏】

遮光, 密闭, 不超过25℃保存。请将本品放在儿童不能接触的地方。

【包装】中硼硅玻璃安瓿(棕色), 10支/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】YBH01962026

【批准文号】国药准字H20263334

## 【上市许可持有人】

名称: 海南皇隆制药股份有限公司

注册地址: 海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

邮政编码: 570311

电话号码: 0898-68616800

网址: <https://www.hnhuanglong.com>

## 【生产企业】

企业名称: 海南爱科制药有限公司

生产地址: 海南省海口市秀英区南海大道283号

邮政编码: 570311

电话号码: 0898-36385777 0898-36380303

网址: <http://www.aikepharm.com.cn>