



OTC
甲类

铝碳酸镁咀嚼片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：铝碳酸镁咀嚼片
英文名称：Hydrotalcite Chewable Tablets
汉语拼音：Lütansuanmei Jujuepian

【成份】

本品每片含0.5克铝碳酸镁。辅料为：玉米淀粉、甘露醇、甘露醇（100SD）、糖精钠、硬脂酸镁、薄荷脑、香蕉味粉末香精。

【性状】

本品为白色或类白色片。

【作用类别】

本品为抗酸与胃黏膜保护类非处方药品。

【适应症】

1. 慢性胃炎。
2. 与胃酸有关的胃部不适症状，如胃痛、胃灼热感（烧心）、酸性暖气、饱胀等。

【规格】0.5克

【用法用量】

咀嚼后咽下。一次1~2片，一日3次。餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用。

【不良反应】

1. 偶见便秘、稀便、口干和食欲缺乏。
2. 大剂量服用可导致软糊状便、大便次数增多/腹泻和呕吐。
3. 过敏反应。

【禁忌】

1. 对本品中任何成份过敏者禁用。
2. 严重肾功能不全者（肌酐清除率<30毫升/分钟）禁用。
3. 低磷血症者禁用。
4. 病理性肌肉无力或疲乏（重症肌无力）者禁用。

【注意事项】

1. 肾功能不全者（肌酐清除率为30~80毫升/分钟）、高镁血症、高钙血症及严重心功能不全者慎用。
2. 孕妇如使用本品后发生腹泻，易增加流产、早产的风险。妊娠期头3个月慎用。妊娠3个月以上应咨询医生。
3. 目前尚无铝碳酸镁通过乳汁分泌的资料。哺乳期妇女应咨询医生。
4. 尚无儿童用药和老年用药的安全性和有效性资料，应在医师指导下使用。
5. 急腹症患者应在医师指导下使用。
6. 低磷饮食患者应在医师指导下使用。
7. 本品连续使用不得超过7天，症状未缓解，请咨询医师或药师。持续、复发的胃病有可能是严重疾病（例如胃或十二指肠溃疡），应及时去医院就诊。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
9. 过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
13. 每日服用铝碳酸镁的总剂量不应超过6克。
14. 阿尔茨海默氏病或其他类型痴呆症患者应避免高剂量或长期服用本品。
15. 肾功能损害者应避免高剂量或长期服用本品，如需服用本品，应定期监测血清镁和铝水平，铝水平不可超过40微克/升。

【药物相互作用】

1. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
2. 服用本品应至少提前或推后1~2小时方可服用其他药物或酸性食物。因氢氧化铝可与其他药物（如：强心苷类，四环素类，氧氟沙星、环丙沙星等喹诺酮类抗菌药物和鹅脱氧胆酸盐）结合而降低其他药物的吸收，影响疗效。此外，同时服用酸性食物（如葡萄酒，果汁等）时，铝的吸收可能会增加。
3. 铝剂可吸附胆盐而减少脂溶性维生素的吸收，特别是维生素A。
4. 与苯二氮革类合用时吸收率降低。
5. 与异烟肼类合用时后者吸收可能延迟与减少，与左旋多巴合用时吸收可能增加。

【药理作用】

本品有明显抗酸作用，并兼有胃黏膜保护作用，对胆酸也有一定吸附作用，其作用迅速、温和、持久。

【贮藏】密封保存。

【包装】

聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔包装。①10片/板×1板/盒；②10片/板×2板/盒；③10片/板×3板/盒；④10片/板×4板/盒；⑤10片/板×5板/盒；⑥10片/板×6板/盒；⑦12片/板×3板/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】YBH11442022

【批准文号】国药准字H20183327

【说明书修订日期】2026年06月26日

【上市许可持有人】

名称：海南皇隆制药股份有限公司

注册地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

邮政编码：570311

电话号码：0898-68616800

传真号码：0898-68616811

网 址：http://www.hnhuanglong.com

【生产企业】

企业名称：海南皇隆制药股份有限公司

生产地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

邮政编码：570311

电话号码：0898-68616800

传真号码：0898-68616811

网 址：http://www.hnhuanglong.com

如有问题可与生产企业联系